

Miminko, 22. 9. 2016

Psychomotorický vývoj

Už od prvních okamžíků pozorujeme své miminko, čekáme, až se pohně, otevře oči, později se na nás usměje. Víme, že každé dítě je jiné a vývoj neprobíhá přesně podle tabulek. Měli bychom ale dávat pozor, abychom nepromeškali nebo nepřehlédli nějakou odchylku, která signalizuje problém ve vývoji.

„Přestože se v úzké vazbě rozumových schopností a pohybového vývoje miminko nachází minimálně do svých patnácti měsíců, fixace abnormálních motorických modelů začíná už kolem 6. týdne života a vrcholu dosahuje po šestém měsíci věku,“ upozorňuje mgr. Ivana Slavíková z Rehabilitační ambulance Nemocnice Mělník.

Kdy navštívit fyzioterapeuta

Obecně je doporučováno jít s miminkem k fyzioterapeutovi mezi 4. a 6. týdnem věku. V této době totiž ještě nedošlo k fixaci nevhodných a špatných předpokladů. Maminky jsou s dětmi bohužel často posílány na rehabilitaci až v případě, kdy jsou viditelné odchylky od ideálního pohybového vývoje miminka. „Maminky k nám často docházejí, aby se ujistily, zda u jejich děťátká probíhá psychomotorický vývoj ideálně. K nejčastějším konkrétním důvodům pak patří například držení hlavičky k jedné straně, nestabilní poloha na břišku a také to, že se miminko nechce na břiško přetáčet,“ osvětuje problematiku nedostatečné prevence mgr. Ivana Slavíková.

Návštěva odborníka je v souvislosti s prevencí velmi důležitá. Brání vzniku a rozvoji svalové nerovnováhy, vadnému držení těla, bolesti a poranění svalů i kloubů a přetížení pohybového aparátu. Pokud si maminka není jistá otáčením miminka či

jeho držením a přenášením, je nejvhodnější variantou navštívit fyzioterapeutu, který mamince poskytne návod na manipulaci s miminkem. Nevhodné zacházení s miminkem může mít negativní vliv na trupové svalstvo a páteř dítěte. Fyzioterapeut maminku naučí zacházet s miminkem takovým způsobem, aby při každém polibku cvičilo a posilovalo ty správné dovednosti.

Drží správně hlavičku?

Castým problémem je podcenění důležitosti polohování miminka, z čehož vzniká tzv. „predilekční držení hlavy“, což znamená, že miminko preferuje otočení hlavy k jedné straně. V tomto období je pozici hlavy ovlivněna poloha trupu i končetin, je tu tedy velká pravděpodobnost, že u miminka dojde k zafixované asymetrickému držení, na základě kterého budou v budoucnu nesouměrné i další polohy. Na problém predilekčního držení hlavy navazuje tzv. „plegiocephalie“, která je rovněž způsobena nedostatečným polohováním hlavičky. Znamená tzv. oploštění hlavy na jedné straně. Tento problém není pouze estetický, ale může také omezovat rozsah pohybu v krční páteři. Třetím rizikem u predilekčního držení hlavy je, že děťátko nebude rovnoměrně přijímat podněty sluchem (jedno ucho je po většinu času v záklýtu hlavy) a také omezení zorného pole.